

Πίνακας 1. Χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών για ενήλικες, 2017

Ηλικία ►	19-26 ετών	27-49 ετών	50-59 ετών	60-64 ετών	≥ 65 ετών
Εμβόλιο ▼					
Γρίπης <sup>1</sup>	1 δόση ετησίως			1 δόση ετησίως	
Τετάνου, Διφθερίτιδας, ακυτταρικό Κοκκύτη (Td, Tdap) <sup>2</sup>	Αντικατάσταση μιας δόσης Td με Tdap και στη συνέχεια 1 δόση Td ανά 10ετία				
Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (MMR) <sup>3</sup>	1 ή 2 δόσεις				
Ανεμευλογιάς (VAR) <sup>4</sup>	2 δόσεις				
Έρπητα Ζωστήρα <sup>5</sup>				1 δόση	
Ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) <sup>6</sup>	3 δόσεις για γυναίκες				
Πνευμονιόκοκκου συζευγμένο (PCV13) <sup>7</sup>	1 δόση			1 δόση	
Πνευμονιόκοκκου πολυσακχαριδικό (PPSV23) <sup>7</sup>	1 ή 2 δόσεις			1 δόση	
Μηνιγγιτιδόκοκκου συζευγμένο (MenACWY) <sup>8</sup>	1 ή περισσότερες δόσεις				
Μηνιγγιτιδόκοκκου Β πρωτεϊνικό (MenB-4C) <sup>9</sup>	2 δόσεις				
Ηπατίτιδας Α (HepA) <sup>10</sup>	2 δόσεις				
Ηπατίτιδας Β (HepB) <sup>11</sup>	3 δόσεις				
Αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου b (Hib) <sup>12</sup>	1 ή 3 δόσεις				



Συστήνονται για όλα τα άτομα με την ανάλογη ηλικία που δεν έχουν ένδειξη ανοσίας



Συστήνονται σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (βλέπε ομάδες αυξημένου κινδύνου)



Δεν συστήνονται