

**Πίνακας 2. Εμβόλια για ενήλικες σε ειδικές ομάδες ατόμων με αυξημένο κίνδυνο, 2017**

Εμβόλιο	Κύηση	Ανοσοκαταστολή (εκτός HIV)	HIV λοίμωξη CD4 λεμφοκύτταρα		Άντρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άντρες	Νεφρική τελικού σταδίου ανεπάρκεια, αιμοδιάλυση	Χρόνια νοσήματα: Διαβήτης, Καρδιακή νόσος, πνευμονοπάθεια, Ρευματικά νοσήματα αλκοολισμός	Ασπληνία Ανεπάρκεια κλασμάτων συμπλ/ματος	Χρόνια ηπατική νόσος	Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
			<200/μl	>200/μl						
Γρίπης <sup>1</sup>			1 δόση ετησίως							
Τετάνου, Διφθερίτιδας, ακυτταρικό Κοκκύτη (Td/Tdap) <sup>2</sup>	1 δόση Tdap/ κύηση		Αντικατάσταση 1 δόσης Td με Tdap και επαναληπτικές δόσεις με Td ανά 10-ετία δια βίου							
Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (MMR) <sup>3</sup>		Αντενδείκνυται	1-2 δόσεις							
Ανεμευλογιάς (VAR) <sup>4</sup>		Αντενδείκνυται	2 δόσεις							
Ερπητα Ζωστήρα <sup>5</sup>		Αντενδείκνυται		1 δόση						
Ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) <sup>6</sup>			3 δόσεις μέχρι την ηλικία των 26 ετών για γυναίκες	3 δόσεις ≤26 ετών	3 δόσεις μέχρι την ηλικία των 26 ετών για γυναίκες					
Πνευμονιόκοκκου συζευγμένο (PCV13) <sup>7</sup>			1 δόση →							
Πνευμονιόκοκκου πολυσακχαριδικό (PPSV23) <sup>7</sup>			1, 2 ή 3 δόσεις →							
Μηνιγγιτιδόκοκκου τετραδύναμο συζευγμένο (MenACWY) <sup>8</sup>			1 ή περισσότερες δόσεις							
Μηνιγγιτιδόκοκκου Β πρωτεϊνικό (MenB-4C) <sup>9</sup>			2 δόσεις →							
Ηπατίτιδας Α (HepA) <sup>10</sup>			2 δόσεις →							
Ηπατίτιδας Β (HepB) <sup>11</sup>			3 δόσεις →							
Αιμοφίλου ινφλουέντζας τύπου b (Hib) <sup>12</sup>			3 δόσεις Μεταμόσχευση μυελού	1 δόση						

→ : Ισχύει και για όλες τις ομάδες που δείχνει το βέλος

Συστήνονται για όλα τα άτομα με την ανάλογη ηλικία που δεν έχουν ένδειξη ανοσίας, π.χ. εμβολιασμό ή φυσική νόσηση.

Συστήνονται αν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου π.χ. υγείας, επαγγέλματος, τρόπου ζωής ή άλλη ένδειξη

Δεν συστήνεται